


FLYTSKJEMA FOR HENVISER:



* Ved bilaterale smerter er det som regel **KUN RØNTGEN** som er indisert, men dersom likevel **MR** henvises det til MR av mest smertefulle side

** RØDE FLAGG:

Symptomer/tegn som tilsier økt risiko for alvorlig patologi:

- Redusert almenntilstand, feber, klarer ikke å belaste, rødt og hovent ledd:
Septisk artritt? - Vurdere akutt innleggelse.
- Misfarging og akutt hevelse hos pas. med kjent blødningstendens (f.eks. blødere):
Spontan blødning i leddet? - Vurdere akutt innleggelse.
- Aktivitetsbetingete lyskesmerter (særlig ved kortikosteroidbruk):
Avaskulær lårbenhode-/hofteleddsnekrose? - Vurdere rtg./MR før 12 uker behandling.
- Aktivitetsrelaterte hoftesmerter hos mosjonister og idrettsutøvere etter gjentatt stor belastning på underekstremiteter (særlig etter løping på hardt underlag):
Tretthetsbrudd i hofte? - Vurdere rtg./MR før 12 uker behandling.



Norsk forening for
allmennmedisin
DEN NORSKE LEGEFORENING



Norsk ortopedisk forening
DEN NORSKE LEGEFORENING



Norsk radiologisk
forening
DEN NORSKE LEGEFORENING